



































## ESSENCES LOCALES présentes dans le PARC NATUREL REGIONAL DE LORRAINE








	NOM	FLORAISON	FEUILLAGE	FRUCTIFICATION	REMARQUES
	<b>Alisier blanc</b> <i>Sorbus aria</i> Arbre, 3-20 m	Mai 	Feuille blanche grisâtre coloration automnale de jaune à brun, défeuillaison tardive	rouge orange septembre	croissance lente, résistant aux vents Rochers, rocailles, bois, sol sec
	<b>Alisier torminal</b> <i>Sorbus torminalis</i> Arbre, 5-25 m	Blanche, mai 	coloration automnale de jaune à rouge	ovoïde, brun septembre - octobre	accepte un couvert complet haies, bois, forêts sèches
	<b>Aubépine épineuse</b> <i>Crataegus laevigata</i> Arbrisseau, 2-10 m	blanche, avril - mai	petites feuilles brillantes, coloration automnale rouge orange	petit fruit orange rouge, longue durée août - octobre	lumière, mellifère, fixation des terres, supporte les tailles les plus sévères, Utilisation de plants greffés Haies, bois, lisières forestières
	<b>Aubépine monogyne</b> <i>Crataegus monogyna</i> Arbuste 4-10 m	blanche ou rose, avril - juin	petites feuilles brillantes, coloration automnale rouge orange	petit fruit orange rouge, longue durée septembre	fixation des terres, supporte les tailles les plus sévères, épines. Utilisation de plants greffés Haies, lisières forestières, bois
	<b>Auline glutineux</b> <i>Alnus glutinosa</i> Petit arbre, peut atteindre 25 m	Chaton jaune au printemps février - avril		petit cône globuleux persistant en hiver septembre - octobre	croissance rapide, variétés horticoles nombreuses, pleine lumière bois humides, bords des eaux, suintements
	<b>Bouleau verruqueux</b> <i>Betula pendula</i> Arbre, 20-25 m	chaton avril - mai	vert clair - vert foncé, coloration automnale jaune 	petit cône sec allongé. juin - août 	écorce lisse et blanche, croissance rapide, lumière forêts claires ou dégradées, landes supporte tous types de sol
	<b>Bourdaie</b> <i>Frangula alnus</i> Arbrisseau, 1-5 m	blanche verdâtre mai	vert mat	petite baie rouge puis noire août	demi-ombre supporte le plein ombragé, mellifère prairies humides, haies, lisières forestières, bois clairs








	NOM	FLORAISON	FEUILLAGE	FRUCTIFICATION	REMARQUES
	<b>Camérisier</b> <i>Lonicera xylosteum</i> Arbrisseau, 2 m	blanche jaunâtre mai - juillet		baie globuleuse rouge	Sol calcaire Bois, haies, lisières forestières
	<b>Cerisier à grappes</b> <i>Prunus padus</i> Arbre, 15 m, Arbrisseau	blanches en grappe, odorantes avril - juin	coloration automnale de jaune à orange	grappe pendante à drupes globuleuses, noires juillet - août	accepte les sols humides, sous-bois, haies, bords de ruisseaux
	<b>Cerisier de Ste-Lucie</b> <i>Prunus mahaleb</i> Arbre, 12 m Arbuste	blanche, odorante avril	brillantes	petit fruit noir juillet - août	coupe-vent, sol calcaire friches, haies, lisières forestières, bois clairs, rochers
	<b>Charme</b> <i>Carpinus betulus</i> Arbre, 10-25 m	chaton avril - mai	Marcescent (les feuilles restent sur l'arbre l'hiver), coloration feuillage doré en hiver	ailé en grappes septembre - octobre	croissance lente, fixation des terres, supporte parfaitement la taille, demi ombre excellent pour les haies, utilisé en ornement (haie de charmille). Bois, haies, craint les sols secs
	<b>Chêne pédonculé</b> <i>Quercus robur</i> Arbre, 25-35 m	chaton avril - mai	défeuillaison tardive couvert léger, coloration autumnale orange	gland	lumière, croissance lente, résistant aux vents
	<b>Chêne sessile</b> <i>Quercus petraea</i> Arbre, 10-30 m	chaton avril - mai	couvert épais, coloration autumnale jaune	Gland 	croissance lente demi_ombre Craint les sols gorgés d'eau Aime les sols profonds bois








	<b>Chèvrefeuille des bois</b> <i>Lonicera periclymenum</i> Liane	blanche jaunâtre ou rougeâtre odorante juin - août		baie rouge	Bois frais, haies, lisières forestières, landes
	<b>Clématite des haies</b> <i>Clematis vitalba</i> Liane	blanche juin - août		Fruit muni d'une longue arête plumeuse septembre	Envahissant Bois clairs, haies, friches, lisières forestières, clairières
	<b>Cormier</b> <i>Sorbus domestica</i> Arbre, 5-20 m	blanche avril - juin	coloration automnale de jaune à rouge orange	gros, vert rougeâtre octobre	croissance lente bois clairs, haies, lisières forestières
	<b>Cornouiller mâle</b> <i>Cornus mas</i> Arbuste, 2-6 m	Floraison jaune d'or en mars 	coloration automnale jaune à jaune brun	rouge foncé, comestible à maturité septembre	croissance lente, supporte le couvert, se prête à la taille, mellifère forêts claires, lisières forestières, haies préfère les sols secs
	<b>Cornouiller sanguin</b> <i>Cornus sanguinea</i> Arbrisseau, 2-5 m	Blanche, parfumée, mai/juin 	coloration automnale rouge	petite baie noire toxique septembre - octobre	Lumière ou demi-ombre, se prête à la taille, mellifère, croissance lente. bois, lisières forestières, haies craint les sols gorgés d'eau
	<b>Eglantier commun</b> Rosier des chiens <i>Rosa canina</i> Arbrisseau, 5 m	Blanche ou rose odorante mai - juin		Baie rouge comestible 	lumière, épines (utilisée pour les haies défensives), croissance rapide craint les sols humides haies, lisières forestières, rochers ensoleillés, haies
	<b>Epine-vinette</b> <i>Berberis vulgaris</i> Arbrisseau, 1-3 m	en grappes, jaunes mai - juin	coloration automnale rouge orange	rouge vif, oblong, comestible septembre - octobre	épines, lumière, fixation des sols, en haie, bosquet nombreuses variétés horticoles lisières forestières, rochers ensoleillés, haies
	<b>Erable champêtre</b> <i>Acer campestre</i> Arbre, 12-15 m	vert jaunâtre. avril/mai 	petites feuilles vert clair, coloration automnale jaunâtre couvert épais	samare septembre	accepte le couvert, fixation des terres, accepte la taille de temps en temps, croissance moyenne, demi-ombre craint les sols humides bois, lisières forestières, forêts ouvertes









	<b>Erable plane</b> <i>Acer platanoides</i> Arbre, 20-30 m	jaune verdâtre, avant les feuilles, avril - mai	vert clair 	coloration automnale jaune orange brillant	samare	accepte le couvert, brise-vent forêts mélangées
	<b>Erable sycomore</b> <i>Acer pseudoplatanus</i> Arbre, 20-30 m	vert jaunâtre en grappes mai vert foncé	coloration automnale jaune orange avec des panachures rougeâtres 		samare	accepte le couvert, croissance rapide, brise-vent bois, haies, lisières forestières, talus, préfère les sols frais à humides
	<b>Framboisier</b> <i>Rubus idaeus</i> Arbrisseau, 1-2 m	blanche ou verdâtre mai - août			framboise juillet - septembre	envahissement rapide, drageonnement, épines, taillis, bois clairs cultivé pour ses fruits
	<b>Frêne commun</b> <i>Fraxinus excelsior</i> Arbre, 20-25 m	brunâtre, avant les feuilles avril		foliation tardive coloration automnale tardive, tombe tardivement	samare pendante, persistante en hiver septembre	croissance rapide, résistant aux vents, demi-ombre aime les sols profonds. La variété pleureuse est utilisée en ornement. Bois frais, haies, bords des eaux
	<b>Fusain d'Europe</b> <i>Evonymus europaeus</i> Arbuste, 2-6 m	blanc verdâtre avril - juin 		vert foncé, pourpre orangé en automne	bonnet d'évêque, rouge-orangé en septembre - octobre	petit arbuste à nombreuses branches, pousse en terrain calcaire préfère les sols frais, demi-ombre haies, lisières forestières, bois
	<b>Groseillier des Alpes</b> <i>Ribes alpinum</i> Arbrisseau, 1-2 m	en grappes, blanches avril			baies rouges en grappe août - septembre	mellifère mi-ombragé à ombragé bois, rocailles
	<b>Groseillier à maquereau</b> <i>Ribes uva-crispa</i> Arbrisseau, 1,5 m	rouge et verdâtre mars - avril			grosse baie juin - août comestibles	mellifère épines bois, ravins, haies
	<b>Groseillier rouge</b> <i>Ribes rubrum</i> Arbrisseau, 2 m	en grappes, blanche mars - avril			baie rouge juin - août comestibles	Mellifère Bois humides, forêts alluviales

	<b>Hêtre</b> <b>Fagus sylvatica</b> Arbre, 30-40 m	chaton globuleux avril - mai	couvert épais coloration autumnale jaune marcescent 	faine octobre	fixation des terres, se soumet aisément à la taille, croissance moyenne demi-ombre. craint les situations en pleine lumière. Créé beaucoup d'ombre bois, haies
	<b>Lierre</b> <b>Hedera helix</b> Liane	jaune verdâtre septembre - octobre	persistant, vert foncé avec panachures blanches	baie noire mars - mai	bois, haies, rochers, murs, parcs
	<b>Merisier</b> <b>Prunus avium</b> Arbre, 15-25 m	grande, blanche avril - mai	coloration automnale de rouge à orange 	merise rouge ou noirâtre comestible en été juin - juillet	porte greffe de cerisier. craint les sols gorgés d'eau aime les sols profonds mellifère haies, bois
	<b>Néflier</b> <b>Mespilus germanica</b> Arbrisseau, 4 m	blanche, grande mai - juin 	vert clair, duveteuses, molles coloration automnale de jaune à rouge brun	néfle, gros, rouge clair brunâtre. comestible blet. Oct-nov 	épinas. Utilisé comme porte greffe de poiriers et cognassiers bois, haies, lisières forestières
	<b>Nerprun purgatif</b> <b>Rhamnus catharticus</b> Arbrisseau, - 5 m	jaunâtre mai - juin	vert foncé, coloration automnale de jaune à brun clair	petite drupe noire septembre - octobre	sous-bois, mellifère haies, manteaux arbustifs, bois clairs
	<b>Noisetier</b> <b>Corylus avellana</b> Petit arbre, 2-5 m	chaton janvier - mars	couvert plus ou moins épais, coloration automnale de jaune à brun	noisette septembre - octobre, nombreuses variétés cultivées pour les fruits.	supporte l'ombrage, croissance rapide, supporte la taille la plus sévère, mellifère, coupe-vent. craint les sols gorgés d'eau bois, haies
	<b>Orme champêtre</b> <b>Ulmus minor</b> Arbre, 35 m	précoce, avant les feuilles, rose pourpre ou rouge mars	vert foncé luisant coloration automnale jaune doré	samare mai	atteint de la graphiose, croissance rapide, lumière, fixation des terres. horticole : orme tortillard (variété) haies, forêts alluviales
	<b>NOM</b>	<b>FLORAISON</b>	<b>FEUILLAGE</b>	<b>FRUIFICATION</b>	<b>REMARQUES</b>

	<p><b>Peuplier blanc</b> <b>Populus alba</b> Arbre, 20-30 m</p>	<p>chaton avant les feuilles mars - avril</p>	<p>blanc dessous</p>	<p>capsule à graines cotonneuses juillet - août</p>	<p>Mellifère. Plusieurs variétés ornementales Bords des eaux</p>
	<p><b>Peuplier grisard</b> <b>Populus canescens</b></p>	<p>chaton avant les feuilles Mars-avril</p>	<p>Feuille blanchâtre dessous</p>	<p>capsule à graines cotonneuses</p>	<p>Bois humides, bords des eaux</p>
	<p><b>Peuplier noir</b> <b>Populus nigra</b> Arbre, 25-30 m</p>	<p>chaton avant les feuilles mars - avril</p>	<p>vert clair, foliation tardive, tombe tôt</p>	<p>capsule à graines cotonneuses juin - juillet</p>	<p>Croissance rapide, résistant aux vents, mellifère. Le peuplier d'Italie est une des variétés de cette espèce. Milieux humides</p>
	<p><b>Peuplier tremble</b> <b>Populus tremula</b> Arbre, 15-20 m</p>	<p>chaton avant les feuilles mars - avril</p>	<p>foliation tardive très mobile, fait du bruit, vert grisâtre</p>	<p>capsule à graines cotonneuses</p>	<p>peu résistant aux vents, en alignement, lumière, espèce pionnière, croissance rapide craint les sols secs forêts dégradées plus ou moins humides, bords des ruisseaux</p>
	<p><b>Poirier sauvage</b> <b>Pyrus pyrastrer</b> Arbre, 20 m</p>	<p>grande, blanche avril - mai</p>	<p>coloration automnale de jaune à orange</p>	<p>petite poire septembre</p>	<p>lumière, mellifère, épines bois, friches, haies</p>
	<p><b>Pommier sauvage</b> <b>Malus sylvestris</b> Arbre, 10 m</p>	<p>blanche et rose avril - mai</p>	<p>petites feuilles</p>	<p>petite pomme, jaune verdâtre septembre - octobre</p>	<p>lumière, mellifère bois clairs, friches, haies</p>
	<p><b>Prunellier</b> <b>Prunus spinosa</b> Arbrisseau, 2-4 m</p>	<p>blanche avant les feuilles avril</p>	<p>petites feuilles</p>	<p>prunelle bleu noirâtre persistant longtemps août - novembre</p>	<p>demi-ombre croissance moyenne, rejets de souches, supporte la taille, drageons, épines. Utilisé dans la constitution de haies vives, défensives (épines). Haies, lisières forestières, bois clairs</p>

	<b>Saule blanc</b> <b>Salix alba</b> Arbre, 15-25 m	chatons (pieds mâles) mars - avril	grisâtre feuillage léger 	capsule mai - juin	croissance rapide, fixation des terres, brise-vent, lumière possibilité de taille en têtard, fournit de l'osier, craint les sols secs
	<b>Saule fragile</b> <b>Salix fragilis</b> Arbre, 15-25 m	Chaton avant les feuilles avril - mai	feuillage léger, vert clair	capsule mai - juin	croissance rapide, lumière, utilisé en vannerie bords des eaux
	<b>Saule marsault</b> <b>Salix caprea</b> Petit arbre, 3-12 m	Chaton avant les feuilles, mars - avril 	vert clair feuillage léger	capsule mai - juin	croissance rapide, fixation des terres, alignements, bosquets, très mellifère craint les sols gorgés d'eau clairières, lisières forestières, bois clairs
	<b>Saule des vanniers</b> <b>Salix viminalis</b> Arbuste, 10 m	chaton avant les feuilles avril - mai	feuillage léger argenté, jaune-orangé en hiver	capsule mai - juin	croissance rapide, lumière, plante mellifère taille en têtard craint les sols secs bords des eaux, alluvions.
Citons également.... Le Saule pourpre, <i>Salix purpurea</i> , Arbrisseau, 6 m Le Saule cendré, <i>Salix cinerea</i> , arbuste, 5 m Le saule à 3 étamines, <i>Salix triandra</i> , arbuste, 10 m					
	<b>Sorbier des oiseleurs</b> <b>Sorbus aucuparia</b> arbre 10-20 m	blanche mai - juin	coloration automnale de jaune orange à rouge orange	petit, rouge vif, persistant l'hiver septembre	croissance rapide, enracinement superficiel utilisé en ornement, surtout en alignement bois, landes de montagne
	<b>Sureau à grappes</b> <b>Sambucus racemosa</b> Arbuste - 4 m	blanche jaunâtre avril - mai		baie rouge corail août - septembre	croissance vigoureuse bois frais, clairières



	NOM	FLORAISON	FEUILLAGE	FRUITIFICATION	REMARQUES
	<b>Sureau noir</b> <b>Sambucus nigra</b> Arbrisseau, 2-10 m	blanche ou jaunâtre, odorante juin - juillet	odorant	baie noire septembre	sous-bois, croissance vigoureuse, supporte la taille bois frais, haies, bords de rivières, lisières forestières
	<b>Tilleul à grandes feuilles</b> <b>Tilia platyphyllos</b> Arbre, 25-35 m	très odorante juin - juillet	couvert épais coloration automnale jaunâtre 	capsule octobre	croissance rapide, vigoureuse, mellifère, supporte la taille demi-ombre craint les sols humides forêts sur sols neutres, souvent roches calcaires
	<b>Tilleul à petites feuilles</b> <b>Tilia cordata</b> Arbre, 20-30 m	odorante juillet	vert foncé brillant couvert épais coloration automnale jaunâtre	capsule octobre	croissance rapide, vigoureuse, mellifère, supporte la taille demi-ombre. Bel arbre isolé ou d'alignement Craint les sols gorgés d'eau, bois
	<b>Troène</b> <b>Ligustrum vulgare</b> ou <b>Ligustrum ovalifolium</b> Arbrisseau, 3 m	blanche, odorante mai - juin	semi-persistant, vert mat parfois panaché	baie noire, persistant longtemps septembre	croissance lente, mellifère, demi-ombre, fixation des terres, supporte la taille, craint les sols gorgés d'eau, plante ornementale. Forêts claires, haies, lisières forestières
	<b>Viorne lantane</b> <b>Viburnum lantana</b> Arbrisseau, 1-3 m	blanche, odorante mai - juin	vert clair, grande coloration automnale rouge	baie rouge puis noire juillet - septembre	Mellifère bois clairs, haies, lisières forestières, rocailles
	<b>Viorne obier</b> <b>Viburnum opulus</b> Arbrisseau, 2-4 m	blanche mai - juin	coloration automnale rouge	baie globuleuse, rouge vif septembre - décembre	croissance moyenne, mellifère, accepte le plein couvert, préfère des sols humides, demi-ombre, variété horticole « boule de neige » sous-bois, haies, lisières forestières bords des eaux